

Jemen Dornschwanzagame

Uromastyx benti

Schutzstatus

WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht

Verbreitung

Jemen und Oman

Lebensraum

Fels- und Geröllwüsten. Tagaktiv

Größe

bis 40 cm

Lebenserwartung

über 15 Jahre

Fortpflanzung

legt in der Regel 6-11 Eier. Inkubationsdauer über 110 Tage bei 30 °C

Temperatur

Fels- und Geröllwüsten. Tagaktiv

Luftfeuchtigkeit

40-70%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder UV Kompaktlampen. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. Art benötigt eine hohe Lichtintensität. Gegebenenfalls empfiehlt sich auch der Einsatz von HQI Strahlern oder T5 Leuchtstoffröhren.

Bodengrund

Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau, Wüstensand

Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache Wasserschale. Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein

Futter

Vegetarische Kost wie z. B. Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee, Luzerne, Feldsalat, Kresse, verschiedene Keimlinge und Sprossen etc., aber auch Karotten, Paprika, Zucchini oder Tomaten (zerkleinert und geraspelt) zusätzlich Trockenfuttermischungen aus Linsen, Reis, Haferflocken, diverse Körner, etc. *Uromastyx benti* benötigt zusätzlich einen hohen Teil an tierischer Kost, wie Insekten (z. B. große Grillen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) und auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie und fertiges Bartagamenfutter. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Bemerkung

Die innerartliche Aggression ist bei dieser Art sehr hoch, es empfiehlt sich eine Einzelhaltung. *Uromastyx benti* wird häufig zu heiß und zu trocken gepflegt

Literatur

WILMS, T. (2001): Dornschwanzagamen. - Herpeton, 142 S.

