

## Südsaharische Dornschwanzagame

*Uromastyx dispar flavifasciata*

### Schutzstatus

WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht

### Verbreitung

Mauretaniens, Algerien, Marokko

### Lebensraum

Steinige und sandige Regionen. Tagaktiv

### Größe

bis 50 cm

### Lebenserwartung

über 15 Jahre

### Fortpflanzung

legt in der Regel über 20 Eier. Inkubationsdauer ca. 80-100 Tage bei 31 °C.

### Temperatur

Steinige und sandige Regionen. Tagaktiv

### Luftfeuchtigkeit

30-50%

### Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder UV Kompaktlampen. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. Art benötigt eine hohe Lichtintensität. Gegebenenfalls empfiehlt sich auch der Einsatz von HQI Strahlern oder T5 Leuchtstoffröhren.

### Bodengrund

Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau, Wüstensand

### Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache Wasserschale. Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein

### Futter

Vegetarische Kost wie z. B. Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee, Luzerne, Feldsalat, Kresse, verschiedene Keimlinge und Sprossen etc., aber auch Karotten, Paprika, Zucchini oder Tomaten (zerkleinert und geraspelt) zusätzlich Trockenfuttermischungen aus Linsen, Reis, Haferflocken, diverse Körner, etc. *Uromastyx benti* benötigt zusätzlich einen hohen Teil an tierischer Kost, wie Insekten (z. B. große Grillen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) und auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie und fertiges Bartagamenfutter. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

### Literatur

WILMS, T. (2001): Dornschwanzagamen. - Herpeton, 142 S.

