

# Augenfleck-Bogenfinger Gecko

Cyrtodactylus peguensis

## Schutzstatus

nicht geschützt

## Verbreitung

Burma, West-Malaysia, Thailand

## Lebensraum

tropisches Flachlandregenwald, dämmerungs- bis nachtaktiv

## Größe

ca. 16 cm

## Lebenserwartung

vermutlich über 5 Jahre

## Fortpflanzung

legt mehrmals jährlich 2 hartschalige Eier. Zeitigungsdauer bei 24-28°C etwa 95 Tage.

## Temperatur

tropisches Flachlandregenwald, dämmerungs- bis nachtaktiv

## Luftfeuchtigkeit

80-100%

## Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

## Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

## Einrichtung

Klettermöglichkeiten nicht unbedingt notwendig, unterschiedliche Verstecke und ein flaches Wassergefäß bilden die Grundausrüstung.

## Futter

Insekten (z. B. kleine Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Mehlwürmer, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

## Bemerkung

Die Art ist bodenbewohnend!

## Literatur

CHAN-ARD, T., GROßMANN, W., GUMPRECHT, A. & K.-D. SCHULZ (1999): Amphibien und Reptilien der Halbinsel Malaysia und Thailands. - Bushmaster Publications, Würselen, 240 S.

MANTHEY, U. & W. GROßMANN (1997): Amphibien & Reptilien Südostasiens. - Natur & Tier Verlag, 512 S.

