

Afrikanische Eierschlange

Dasypeltis scabra

Schutzstatus

Nicht geschützt

Verbreitung

Teile Afrikas (u. a. S-Marokko, Ägypten, Sudan, Somalia, bis nach W-, O-, Z- und S-Afrika)

Lebensraum

trockene Busch- und Waldgebiete

Größe

50-70 cm, max. 120 cm

Fortpflanzung

legt bis zu 18 Eier. Zeitigungsdauer bei 30 °C etwa 60-70 Tage

Temperatur

trockene Busch- und Waldgebiete

Luftfeuchtigkeit

40-50%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

Bodengrund

Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau, Wüstensand

Einrichtung

Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache kleine Wasserschale. Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, F. pumila, Scindapsus ect.)

Futter

je nach Größe: Eier von Kanarienvögeln, Wellensittichen oder Europäischen Wachteln

Bemerkung

Wenn das Problem der Futtermittellieferung gelöst wurde, ist *Dasypeltis scabra* i.d.R. ein einfach zu haltender Pflegling

Literatur

TRUTNAU, L. (2002): Ungiftige Schlangen, Schlangen im Terrarium, Band 1. - Ulmer Verlag, 628 S.



ein Service von **Lucky Reptile**